

別紙 1 5

【薬効分類】 胃腸薬

【医薬品名】 オメプラゾール含有製剤（要指導医薬品）

【措置内容】 以下のように使用上の注意を改めること。

下線は変更箇所

現行		改訂案	
相談すること		相談すること	
服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること		服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること	
関係部位	症 状	関係部位	症 状
精神神経系	頭痛、眠気、しびれなどの異常な感覚、めまい、ふるえ、不眠、うつ状態、 <u>一時的にボーとする、意識の低下、気を失う</u>	精神神経系	頭痛、眠気、しびれなどの異常な感覚、めまい、ふるえ、不眠、うつ状態
その他	目のかすみ、発熱、むくみ、女性化乳房（男性の乳房が女性のように膨らむ）、脱毛、からだがだるい、関節痛、味覚異常、月経異常、筋肉痛、発汗、筋力の低下、 <u>顔や手足の筋肉がぴくつく、手足の筋肉が硬直しガクガクとふるえる</u>	その他	目のかすみ、発熱、むくみ、女性化乳房（男性の乳房が女性のように膨らむ）、脱毛、からだがだるい、関節痛、味覚異常、月経異常、筋肉痛、発汗、筋力の低下
まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。 (新設)		まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。	
		症状の名称	症 状

	<u>低マグネシウム血症</u>	<u>吐き気、嘔吐、食欲不振、体がだるい、顔や手足の筋肉がぴくつく、一時的にボーとする、意識の低下、手足の筋肉が硬直しガクガクと震える、しびれ、めまい、動悸、気を失う等があらわれる。</u>
--	------------------	---